

FJÄRILS- RÄKNING

JULI/AUGUSTI 26

Välkommen att delta i vår årliga fjärilsräkning. Räkna alla fjärilar du ser, gärna i närheten av en äng eller en trädgård och notera dem.

Använd detta formulär eller anteckna någon annan stans. Efteråt får du gärna skicka ditt resultat till info@greenarchipelago.se

Tack för att du deltar!

RÄKNING

NÅGON ART AV PÄRLEMOR

NÅGON ART AV GULDINGE

NÅGON ART AV BLÅVINGE

KÅL-/RAPS-/ROVFJÄRILAR

NÅGON GRÄSFJÄRIL

SORGMANTEL

TISTELFJÄRIL

PÅFÅGELÖGA

ÄNGSNÄTFJÄRIL

APOLLOFJÄRIL

AMIRAL

HAGTORNSEFJÄRIL

CITRONFJÄRIL

NÄSSELFJÄRIL

DATUM _____

TID (TEX. 12-14) _____

PLATS _____

NAMN _____

EPOST _____



NÅGON PÄRLEMORFJÄRIL

Det finns minst tio olika arter av Pärlemorfjäril i skärgården: Brunfläckig-, Hed-, Prydlig-, Silverstreckad-, Skogs-, Skugg-, Storfläckig-, Älgräs- och Ängspärlemorfjäril. Silverstreckad Pärlemorfjäril *Argynnis paphia* (på bilden) är en av de vanligaste och den vi såg flest av i fjärilsräkningen 2022.



NÅGON BLÅVINGAR

Blåvingar en tribus av fjärilar som dras till växter som växer i kalkrik jord. Håll utkik efter den Starkt Hotade Fetörtsblåvingen (på bilden) som länge ansågs utrotad i skärgården. Du kan också stöta på Hed-, Brun-, Klöver-, Ljung-, Midsommar-, Mindre -, Puktörn-, Silver-, Toste-, Violett- och Ängsblåvinge.



NÅGON GRÄSFJÄRILAR

Gräsfjärilar kan vara knepiga att särskilja när fladdrar förbi på ängarna, särskilt eftersom hanen och honan skiljer sig åt. Under förra årets Fjärilsräkning såg deltagarna Kvik-, Lukt- (på bilden), Sand- och Slåttergräsfjäril. Det finns sju kända arter till i skärgården: Berg-, Kam-, Pärl-, Skogs-, Starr-, Svingel- och Vitgräsfjäril.



NÅGON GULDVINGAR

Det finns tre kända av Guldvingefjärilar på våra öar, men den vanligaste är Mindre Guldvinge, *L. phlaeas*. Det är svårt att se skillnad på Violettekantad eller Vitfläckig Guldvinge eftersom skillnaden är mycket små. Bergsyra *Rumex acetosella* är en viktig värdväxt och kopplas ofta ihop med betande får.



KÅL-/RAPS-/ROVFJÄRIL

Ofta kallar man alla vita fjärilar Kålfjärilar, när det i själva verket är tio olika fjärilar som trivs i ditt källand. Kål- *Pieris brassicae*, Raps- *Pieris napi* and Rovfjäril *Pieris rapae* har alla vita vingar som slutar i svarta fläckar framåt, liksom honon Aurorafjäril *Anthocharis cardamines*.



SORGMANTEL
NYMPHALIS ANTIOPA

Sorghmanteln är lätt att känna igen med sina mörkröda vingar med gula kanter som bleknar med åren. De som lever i skogsbryn som larver älskar björk och pil. Larverna kläcks i slutet av juli och flyger fram till början av oktober då de övervintrar i vedhögar och gamla stammar. Den årliga population kan variera mycket.



TISTELFJÄRIL
VANESSA CARDUI

Tistelfjärilen immigrerar från Afrika eftersom de inte kan övervintra här. Vål här hittas de i de miljöer som har rikligt med nektar. Populationen kan variera stort olika år beroende på vädret. Tistlar *Cardus spp.* och Gråbo *Artemisia vulgaris* är viktiga växter för denna art.



PÅFÅGELÖGA
AGLAIS IO

Hanen och honan ser likadana ut. I likhet med övriga dagfjärilar som övervintrar som vuxna fjärilar har vingkanterna utskott som underlättar avrinnandet av kondensvatten under övervintringen. Påfågelöga är ett kärt vårtecken och samtidigt med blommande Tussilago *Tussilago farfara* och Sälga *Salix caprea* som är viktiga nektarresurser.



ÄNGSNÄTFJÄRIL
MELITAEA CINXIA

Den Nära Hotade Ängsnätfjärilen flyger oftast i skärgårdsmiljöer som här, men också på Gotland, Öland och Åland. Arten dras till öppna marker och specifika växtarter under olika delar av livscykel. Axveronica *Veronica spicata* är viktig för larvstadiet och bör skyddas och planteras.



APOLLOFJÄRIL
PARNASSIUS APOLLO

Storleken (upp till 87 mm) och de gråvita vingarna med svarta och röda "ögon" gör appollofjärilan lätt att känna igen. Med sina nästan genomskinliga vingar ser fjärilen skör ut men den trivs mycket bra i våra karga skärgårdsförhållanden. Stockholms skärgård ett mycket viktigt habitat för denna Nära Hotade art. Lavar och mossor är viktiga.



AMIRAL
VANESSA ATALANTA

Den distinkta svarta, röda och vita amiralen kan man hitta lite överallt. Vuxna immigranter hittar hit i maj-juni och överlever fram till oktober då den gärna glufsar i sig rutten frukt. Arten kan övervintra i södra Sverige men inte här i skärgården så här är alla influgna från Centraleuropa.




HAGTORNFJÄRIL
APORIA CRATAEGI

Hagtornsfjärilen hittas främst i buskmarker, hyggen och igenväxande hagmarker där ett flertal träd och buskar fungerar som värdväxt. Larverna är osmakliga vilket tidvis leder till massförökning och spridning. De flyger enbart under ca en månad juni-juli.



CITRONFJÄRIL
GONEPTERYX RHAMNI

Citronfjärilen är en av de mest långlivade fjärilarna. Larverna kläcks i juli-augusti för att sedan övervintra, parningen sker efter övervintringen i april-maj. Honan är ljusare och blekt grönvit medan hanen är starkt citrongul. Arten är beroende av antingen Brakved *Frangula alnus* eller Getapel *Rhamnus cathartica*.



NÄSSEFJÄRIL
AGLAIS URTICAE

Övervintrande honor lägger sina ägg på den kväverika Nässlan *Urtica dioica* i april-maj och kan inte överleva utan dessa växter. Den nya generationen kläcks i juni-augusti, övervintrar och blir efter det köns mogna. Nässefjärilen är i samma familj *Aglais spp.*, som Påfågelöga, med samma iriserande blå.



Tillsammans för
en livskraftig
Nämdöskärgård

